BIBLIOGRAFIA DOS CERRADOS DA APA DO GAMA CABEÇA DO VEADO: BOTÂNICA - ZOOLOGIA - ECOLOGIA

Raimundo Paulo Barros Henriques
Helena Castanheira de Morais
Alexandre Ramlo Torre Palma

Departamento de Ecologia
Universidade de Brasília

Brasília, DF
1999

SUMÁRIO

Prefácio.....iv

Lista de Referências.....1

Índice de Autores.....17

Índice de Assuntos.....22

PREFÁCIO

A Área de Proteção Ambiental (APA) do Gama e Cabeça do Veado foi criada pelo Decreto nº9417 de 21 de abril de 1986 pelo Governo do Distrito Federal. A APA possui uma área de aproximadamente 25.000 hectares. Constituem partes importantes da APA as áreas da Fazenda Água Limpa administrada pela Universidade de Brasília com 4.040 hectares; a Reserva Ecológica do IBGE com 1.360 hectares e o Jardim Botânico com 5.000 hectares. Estas áreas formam reservas com graus variados de proteção e tem permitido diversas atividades de ensino e pesquisas. Juntamente com as áreas protegidas, são incluídas também áreas rurais e urbanas. Ao longo dos últimos 19 anos um acervo considerável de informação resultado de vários estudos tem se acumulado.

A APA se localiza na área *core* da Região dos Cerrados e contém as principais fisionomias de vegetação deste Bioma. São encontradas: mata de galeria, cerradão, cerrado, campo sujo, campo limpo, vereda, campo rupestre, campo de murundú.

Os estudos na APA iniciaram-se com o trabalho pioneiro de Mello e Moojen (1979) sobre os pequenos mamíferos da região. Desde esta data uma grande variedade de temas tem sido tratados, alguns dos quais são pioneiros nos Cerrados e mesmo no Brasil, como os estudos de campo sobre fotossíntese de plantas dos Cerrados (Johnson, Franco e Caldas 1983; Pereira e Hay 1986). Outros estudos mais recentes tratam de temas de importância para as mudanças globais do planeta (Pott *et al.* 1995; Riggan *et al.* 1993). A totalidade dos estudos realizados na APA até agora indicam que ela é uma das áreas dos Cerrados melhor conhecida em termos ecológicos, botânicos e zoológicos.

Os objetivos desta compilação são: (1) tornar disponível para um público mais amplo informações que podem ser úteis para o manejo e conservação dos Cerrados; (2) estimular e ajudar no planejamento das atuais atividades de pesquisa na área da APA.

Esta bibliografia não pretende ser uma lista exaustiva de toda a literatura sobre a região sendo incluídos apenas, artigos de revistas científicas nacionais e internacionais; capítulos de livros e livros publicados até 1997. No entanto, após as conclusão desta compilação já em 1998, outros trabalhos com data de 1997 ainda estavam sendo publicados, mas acreditamos que ela contém os trabalhos principais e mais antigos, conhecidos apenas de um pequeno grupo de pesquisadores. Existe uma série de outras informações contidas em relatórios e teses, as quais não são de fácil acesso e foram omitidas da presente lista. No caso de teses, uma publicação específica está em planejamento (Miranda, H. S.; *comunicação pessoal*).

Esta compilação consiste de uma lista de referências bibliográficas organizadas em ordem alfabética pelo nome dos autores e contém índices de autores e de assuntos. Na elaboração do índice de assuntos, foi incluída apenas as palavras do título dos trabalhos. Algumas publicações que foram incluídas, não contém a localidade de estudo, mas é do conhecimento dos autores desta lista que o trabalho foi realizado na APA.

Os autores

LISTA DE REFERÊNCIAS

1. Alho, C. J. R., 1981. Small mammal populations of Brazilian cerrado: The dependence of abundance and diversity on habitat complexity. **Revista Brasileira de Biologia**, 41: 223-230.

2. Alho, C. J. R., 1982. Quantitative components of three cerrado landscape habitats in Brazil. **Tropical Ecology**, 23: 125-133.

3. Alves, M. A. S., 1990. Social system and helping behavior in the white-banded tanager (*Neothraupis fasciata*). **Condor**, 92: 470-474.

4. Alves, M. A. S., 1991. Dieta e táticas de forrageamento de *Neothraupis fasciata* em cerrado no Distrito Federal, Brasil (Passeriformes: Emberezidae). **Ararajuba**, 2: 25-29.

5. Andrade, I.; Diniz, I. R. & Morais, H. C., 1995. A lagarta de *Cerconota achatina* (Oecophoridae: Stenomatinae): Biologia e ocorrência em plantas hospedeiras do gênero *Byrsonima* (Malpighiaceae). **Revista Brasileira de Zoologia**, 12: 735-741.

6. Andrade, S. M. A. & Miranda, H. S., 1997. Dinâmica de combustível em uma área de campo sujo de cerrado submetida a queimada prescrita no final da estação seca. *In*: Leite, L. L. & Saito, C. H. (Eds.). **Contribuição ao conhecimento ecológico do cerrado**. Departamento de Ecologia, Universidade de Brasília, Brasília-DF. p. 262-267.

7. Araújo, A. F. B.; Costa, E. M. M.; Oliveira, R. F.; Ferrari, K.; Simon, M. F. & Pires-Júnior, O. R., 1996. Efeitos de queimadas na fauna de lagartos do Distrito Federal. *In*: Miranda, H. S.; Saito, C. H. & Dias, B. F. S. (Eds.). **Impactos de queimadas em áreas de cerrado e restinga**. Universidade de Brasília, Brasília-DF. p. 148-160.

8. Araujo Neto, M. D.; Furley, P. A.; Haridasan, M. & Johnson, C. E., 1986. The murundus of the cerrado region of central Brazil. **Journal of Tropical Ecology**, 2: 17-35.

9. Azevedo, F. C. C. & Gastal, M. L. A., 1997. Hábito alimentar do lobo guará (*Chrysocyon brachyurus*), na APA do Gama / Cabeça de Veado, DF. *In*: Leite, L. L. & Saito, C. H. (Eds.). **Contribuição ao conhecimento ecológico do cerrado**. Departamento de Ecologia - Universidade de Brasília, Brasília. p. 238-240.

10. Barros, M. A. G., 1992. Fenologia da floração, estratégias reprodutivas e polinização de espécies simpátricas do gênero *Byrsonima* Rich (Malpighiaceae). **Revista Brasileira de Biologia**, 52: 343-353.

11. Batmanian, G. J. & Haridasan, M., 1985. Primary production and accumulation of nutrients by the ground layer community of cerrado vegetation of central Brazil. **Plant and Soil**, 88: 437-440.

12.Bizerril, M. X. A. & Gastal, M. L. A., 1997. Fruit fenology and mammal frugivory in *Renealmia alpinia* (Zingiberaceae) in a gallery forest of central Brazil. **Revista Brasileira de Biologia**, 57: 305-309.

13.Bizerril, M. X. A. & Raw, A., 1997. Feeding specialization of two species of bats and the fruit quality of *Piper arboreum* in a central Brazilian gallery forest. **Revista de Biologia Tropical**, 45: 913-918.

14.Bustamante, M. M. C.; Kozovits, A. R.; Silva, L. F. & Duarte, G. F., 1996. Nitrate assimilation in "cerrado" woody species. *In*: Pereira, R. C. & Masser, L. C. B. (Eds.). **VIII Simpósio sobre o cerrado**. EMBRAPA/CPAC, Planaltina-DF. p. 303-307.

15.Bustamante, M. M. C.; Kozovits, A. R.; Silva, L. F.; Duarte, G. F. & Castro, A. A., 1997. Assimilação de nitrato e taxas fotossintéticas de três espécies lenhosas de cerrado. *In*: Leite, L. L. & Saito, C. H. (Eds.). **Contribuição ao conhecimento ecológico do cerrado**. Departamento de Ecologia, Universidade de Brasília, Brasília-DF. p. 49-53.

16.Causin, H. F. & Bustamante, M. M. C., 1997. A comparative study of different nitrogen fractions in three woody species of the cerrado. *In*: Leite, L. L. & Saito, C. H. (Eds.). **Contribuição ao conhecimento ecológico do cerrado**. Departamento de Ecologia, Universidade de Brasília, Brasília-DF. p. 41-48.

17.Cavalcanti, R. B. & Marini, M. A., 1993. Body masses of birds of the Cerrado region, Brazil. **Bulletin of the British Ornithologists' Club**, 113: 211-214.

18.Cavedon, A. D. & Sommer, S., 1990. **Levantamento semidetalhado dos solos do Jardim Botânico de Brasília**. Fundação Zoobotânica, Brasília - DF. 95 p.

19.César, H. L. & Gifford, D. R., 1982. Flora indicadora de fogo e corte em um campo do Distrito Federal. **Anais do XXXII Congresso Nacional de Botânica**, 1: 201-206.

20.Cintra, R., 1988. Reproductive ecology of the ruddy ground-dove on the central plateau of Brazil. **Wilson Bulletin**, 100: 443-457.

21.Cintra, R.; Alves, M. A. S. & Cavalcanti, R. B., 1990. Dieta da rolinha *Columbina talpacoti* (Aves, Columbidae) no Brasil central - comparação entre sexos e idades. **Revista Brasileira de Biologia**, 50: 469-473.

22.Coles de Negret, H. R. & Redford, K. H., 1982. The biology of nine termite species (Isoptera: Termitidae) from the cerrado of central Brazil. **Psyche**, 89: 81-106.

23.Collevatti, R. G. & Hay, J. D., 1997. Arquitetura e riqueza de herbívoros em *Ouratea hexasperma* Baill. (ochnaceae) em um cerrado da Reserva Ecológica do IBGE, Brasília, DF. *In*: Leite, L. L. & Saito, C. H. (Eds.). **Contribuição ao conhecimento ecológico do cerrado**. Departamento de Ecologia, Universidade de Brasília, Brasília-DF. p. 95-100.

24.Coutinho, L. M., 1990. O cerrado e a ecologia do fogo. **Ciência Hoje**, 12: 22-30.

25.Dias, B. F. S., 1989. Effects of fire regime on cerrado community structure and dynamics. **RSSD Newsletter (CSIRO)**, 3: 19-22.

26.Dias, I. F. O.; Miranda, A. C. & Miranda, H. S., 1996. Efeitos de queimadas no microclima de solos de campos de cerrado - DF / Brasil. *In*: Miranda, H. S.; Saito, C. H. & Dias, B. F. S. (Eds.). **Impactos de queimadas em áreas de cerrado e restinga**. Universidade de Brasília, Brasília-DF. p. 11-19.

27.Dias, V. S.; Brossard, M. & Lopes Assad, M. L., 1997. Macrofauna edáfica invertebrada em áreas de vegetação nativa da região de cerrados. *In*: Leite, L. L. & Saito, C. H. (Eds.). **Contribuição ao conhecimento ecológico do cerrado**. Departamento de Ecologia, Universidade de Brasília, Brasília-DF. p. 168-173.

28.Diniz, I. R. & Morais, H. C., 1995. Larvas de Lepidoptera e suas plantas hospedeiras em um cerrado de Brasília, DF. **Revista Brasileira de Entomologia**, 39: 755-770.

29.Diniz, I. R. & Morais, H. C., 1997. Lepidopteran caterpillar fauna of cerrado host plants. **Biodiversity and Conservation**, 6: 817-836.

30.Domingos, D. J., 1983. Preferência alimentar de *Armitermes euamignathus* (Isoptera, Termitidae, Nasutitermitinae) em cinco formações vegetais do cerrado. **Revista Brasileira de Biologia**, 43: 339-344.

31.Domingos, D. J., 1985. Densidade e distribuição espacial de ninhos de duas espécies de *Armitermes* (Isoptera, Termitidae) em cinco formações vegetais do cerrado. **Revista Brasileira de Biologia**, 45: 233-240.

32.Egler, I. & Haridasan, M., 1987. Alteration of soil properties by *Procornitermes araujoi* Emerson (Isoptera, Termitidae) in the latosols of the cerrado region of central Brazil. *In*: San José, R. R. & Montes, R. (Eds.). **La capacidad bioproductiva de Sabanas**. IVIC/Ciet, Caracas. p. 280-308.

33.Eiten, G. & Sambuichi, H. R., 1996. Effect of long-term periodic fire on plant diversity in a cerrado region. *In*: Pereira, R. C. & Masser, L. C. B. (Eds.). **VIII Simpósio sobre o cerrado**. EMBRAPA/CPAC, Planaltina-DF. p. 46-55.

34.Encinas, J. I., 1991. Inventário florestal por faixas de amostragem. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, 26: 25-30.

35.Encinas, J. I. & Monti, E. R., 1989. Cálculo do coeficiente de volume no cerrado grosso de Brasília. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, 24: 1457-1459.

36.Ernest, K. A. & Mares, M. A., 1986. Ecology of *Nectomys squamipes*, the neotropical water rat, in central Brazil: home range, habitat selection, reproduction and behaviour. **Journal of Zoology**, 210: 599-612.

37.Faria, D. S., 1984. Aspectos gerais do comportamento de *Callithrix jacchus penicillata* em mata ciliar do cerrado. *In*: Mello, M. T. (Ed.). **A primatologia no Brasil**. Editora da UFMG, Belo Horizonte. p. 55-65.

38.Faria, D. S., 1984. Uso de árvores gomíferas do cerrado por *Callithrix jacchus penicillata*. *In*: Mello, M. T. (Ed.). **A primatologia no Brasil**. Editora da UFMG, Belo Horizonte. p. 83-96.

39.Faria, D. S., 1985. Tamanho, composição de um grupo social e área de vivência (home-range) do sagui *Callithrix jacchus penicillata* na mata ciliar do Córrego Capetinga, Brasília, DF. *In*: Mello, M. T. (Ed.). **A primatologia no Brasil 2 - Anais do 2º Congresso Brasileiro de Primatologia**., Campinas-SP. p. 87-105.

40.Faria, D. S., 1989. O estudo de campo do mico-estrela *Callithrix penicillata* do planalto central brasileiro. *In*: Ades, C. (Ed.). **Etologia de animais e homens**. Edicon, São Paulo. p. 109-121.

41.Felfili, J. M., 1994. Floristic composition and phytosociology of the gallery forest alongside the Gama stream in Brasilia, DF, Brazil. **Revista Brasileira de Botânica**, 17: 1-11.

42.Felfili, J. M., 1995. Diversity, structure and dynamics of a gallery forest in central Brazil. **Vegetatio**, 117: 1-15.

43.Felfili, J. M., 1995. Growth, recruitment and mortality in the Gama gallery forest in central Brazil over a six-year period (1985-1991). **Journal of Tropical Ecology**, 11: 67-83.

44.Felfili, J. M.; Haridasan, M.; Mendonça, R. C.; Filgueiras, T. S.; Silva, M. C. & Rezende, A. V., 1994. Projeto biogeografia do bioma cerrado: Vegetação e solos. **Cadernos de Geociências**, 12: 75-166.

45.Felfili, J. M. & Silva, M. C., 1988. Distribuição dos diâmetros numa faixa de cerrado na Fazenda Água Limpa (FAL) em Brasília, DF. **Acta Botânica Brasílica**, 2: 85-104.

46.Felfili, J. M. & Silva, M. C., 1992. Floristic composition, phytosociology and comparision of cerrado and gallery forest at Fazenda Água Limpa, Federal District, Brazil. *In*: Furley, P. A.; Proctor, J. A. & Ratter, J. A. (Eds.). **Nature and dynamics of forest-savanna boundaries**. Chapman and Hall, London. p. 393-415.

47.Felfili, J. M. & Silva, M. C., 1993. A comparative study of cerrado (*sensu stricto*) vegetation in central Brazil. **Journal of Tropical Ecology**, 9: 277-289.

48.Felfili, J. M.; Silva, M. C.; Rezende, A. V.; Machado, J. W. B.; Walter, B. M. T.; Silva, P. E. N. & Hay, J. D., 1993. Análise comparativa da florística e fitossociologia da vegetação arbórea do cerrado *sensu stricto* na Chapada Pratinha, DF, Brasil. **Acta Botânica Brasílica**, 6: 27-46.

49.Felfili, J. M.; Silva, M. C.; Rezende, A. V.; Nogueira, P. E.; Walter, B. M. T.; Felfili, M. C.; Silva, M. A. & Encinas, J. I., 1997. Comparação do cerrado (*sensu stricto*) nas Chapadas Pratinha e dos Veadeiros. *In*: Leite, L. L. & Saito, C. H. (Eds.). **Contribuição ao conhecimento ecológico do cerrado**. Departamento de Ecologia, Universidade de Brasília, Brasília-DF. p. 6-11.

50.Filgueiras, T. S. & Pereira, B. A. S., 1989. Efeito de uma geada sobre a flora do cerrado na Reserva Ecológica do IBGE, DF, Brasil. **Cadernos de Geociências**, 2: 67-70.

51.Fonseca, G. A. B. & Lacher, T. E., 1984. Exudate-feeding by *Callithrix jacchus penicillata* in semideciduous woodland (cerradão) in central Brazil. **Primates**, 25: 441-450.

52.Fonseca, G. A. B. & Redford, K. H., 1984. The mammals of IBGE's ecological reserve, Brasília, and an analysis of the role of gallery forests in increasing diversity. **Revista Brasileira de Biologia**, 44: 517-523.

53.Fonseca, G. A. B.; Redford, K. H. & Pereira, L. A., 1982. Notes on *Didelphis albiventris* (Lund, 1841) of central Brazil. **Ciência e Cultura**, 34: 1359-1362.

54.Franco, A. C.; Nardoto, G. B. & Souza, M. P., 1996. Patterns of soil water potential and seedling survival in the cerrados of central Brazil. *In*: Pereira, R. C. & Masser, L. C. B. (Eds.). **VIII Simpósio sobre o cerrado**. EMBRAPA/CPAC, Planaltina-DF. p. 277-283.

55.Franco, A. C.; Souza, M. P. & Nardoto, G. B., 1996. Estabelecimento e crescimento de *Dalbergia miscolobium* Benth. em áreas de campo sujo de cerrado no DF. *In*: Miranda, H. S.; Saito, C. H. & Dias, B. F. S. (Eds.). **Impactos de queimadas em áreas de cerrado e restinga**. Universidade de Brasília, Brasília-DF. p. 84-92.

56.Fundação Zoobotânica., 1990. **Levantamento da vegetação do Jardim Botânico de Brasília-DF**. Fundação Zoobotânica, Brasília - DF. 93 p.

57.Furley, P. A., 1985. **Notes on the soils and plant communities of Fazenda Água Limpa, Brasilia, DF**. Occasional Publications, N.S., n° 5, Department of Geography, University of Edinburgh, Edinburgh. 138 p.

58.Furley, P. A., 1986. Classification and distribution of murundus in the cerrado of central Brazil. **Journal of Biogeography**, 13: 265-268.

59.Gettinger, D., 1987. Host association of *Gigantolaelaps* (Acari: Laelapidae) in the cerrado province of central Brazil. **Journal of Medical Entomology**, 24: 559-565.

60.Gettinger, D. & Ernest, K. A., 1995. Small-mammal community structure and the specificity of ectoparasite associations in central Brazil. **Revista Brasileira de Biologia**, 55: 331-341.

61.Gettinger, D. & Gribel, R., 1989. Spinturnicid mites (Gamasida: Spinturnicidae) associated with bats in central Brazil. **Journal of Medical Entomology**, 26: 491-493.

62.Gribel, R., 1988. Visits of *Caluromys lanatus* (Didelphidae) to flowers of *Pseudobombax tomentosum* (Bombacaceae): A probable case of pollination by marsupials in central Brazil. **Biotropica**, 20: 344-347.

63.Gribel, R. & Hay, J. D., 1993. Pollination ecology of *Caryocar brasiliense* (Caryocaraceae) in central Brazil cerrado vegetation. **Journal of Tropical Ecology**, 9: 199-211.

64.Haridasan, M., 1982. Aluminum accumulation by some cerrado native species of central Brazil. **Plant and Soil**, 65: 265-273.

65.Haridasan, M.; Caldas, L. S. & Encinas, J. I., 1988. Níveis de nutrientes foliares de algumas espécies de eucaliptos em um latossolo do Distrito Federal. **Savanas: alimento e energia - VI Simpósio sobre o cerrado**. EMBRAPA/CPAC, Brasília-DF. p. 399-407.

66.Haridasan, M.; Hill, P. G. & Russell, D., 1987. Semiquantitative estimates of Al and other cations in the leaf tissues of some Al-accumulating species using electron probe microanalysis. **Plant and Soil**, 104: 99-102.

67.Haridasan, M.; Paviani, T. I. & Schiavini, I., 1986. Localization of aluminum in the leaves of some aluminum accumulating species. **Plant and Soil**, 94: 435-437.

68.Hay, J. D. & Barreto, E. J. M., 1988. Natural mortality of *Vochysia thyrsoidea* in an unburnt cerrado ecosystem near Brasilia. **Biotropica**, 20: 274-279.

69.Heinze, J.; Trunzer, B.; Oliveira, P. S. & Holldobler, B., 1996. Regulation of reproduction in the neotropical ponerinae ant, *Pachycondyla villosa*. **Journal of Insect Behavior**, 9: 441-450.

70.Henriques, R. P. B., 1997. Nest density of *Trigona spinipes* (Hymenoptera: Apidae) in cerrado vegetation of central Brazil. **Revista de Biologia Tropical**, 45: 700-701.

71.Henriques, R. P. B. & Alho, C. J. R., 1991. Microhabitat selection by two rodent species in the cerrado of central Brazil. **Mammalia**, 55: 50-56.

72.Henriques, R. P. B.; Bizerril, M. X. A. & Kohlsdorf, T., 1997. Abundância, riqueza e seleção de habitat de pequenos mamíferos dos cerrados do Brasil central. *In*: Leite, L. L. & Saito, C. H. (Eds.). **Contribuição ao conhecimento ecológico do cerrado**. Departamento de Ecologia, Universidade de Brasília, Brasília-DF. p. 127-130.

73.Henriques, R. P. B.; Rocha, I. R. D. & Kitayama, K., 1992. Nest density of some social wasp species in cerrado vegetation of central Brazil (Hymenoptera: Vespidae). **Entomologia Generalis**, 17: 265-268.

74.Heringer, E. P. & Paula, J. E., 1989. Contribuição para o conhecimento ecodendrométrico de matas ripárias da região centro-oeste brasileira. **Acta Botânica Brasílica**, 3: 33-42.

75.Hoffman, W. A., 1994. Demographic effects of fire on woody plants of the cerrado savanna of central Brazil. *In*: Fralish *et al.* (Ed.). **Proceedings of the North American conference on Barrens and Savannas**., . p. 205-212.

76.Hoffman, W. A., 1996. The effects of fire and cover on seedling establishment in a neotropical savanna. **Journal of Ecology**, 84: 383-393.

77.Johnson, C. E.; Franco, A. C. & Caldas, L. S., 1983. Fotossíntese e resistência foliar em espécies nativas do cerrado: metodologia e resultados preliminares. **Revista Brasileira de Botânica**, 6: 91-97.

78.Kauffman, J. B.; Cummings, D. L. & Ward, D. E., 1994. Relationships of fire, biomass and nutrient dynamics along a vegetation gradient in the Brazilian cerrado. **Journal of Ecology**, 82: 519-531.

79.Kitayama, K., 1993. Ocorrência de *Pulvinaria flavescens* Brethes, 1918 (Homoptera: Coccidae) em *Citrus reticulata* Blanco em Brasília, DF. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, 28: 889-895.

80.Kozovits, A. R.; Bustamante, M. M. C.; Silva, L. F.; Duarte, G. F.; Castro, A. A. & Magalhães, J. R., 1996. Nitrato e amônia no solo e sua assimilação por espécies lenhosas em uma área de cerrado submetida a queimadas prescritas. *In*: Miranda, H. S.; Saito, C. H. & Dias, B. F. S. (Eds.). **Impactos de queimadas em áreas de cerrado e restinga**. Universidade de Brasília, Brasília-DF. p. 137-147.

81.Lacher, T. E.; Egler, I.; Alho, C. J. R. & Mares, M. A., 1986. Termite community composition and mound characteristics in two grassland formation in central Brazil. **Biotropica**, 18: 356-359.

82.Lacher, T. E.; Fonseca, G. A. B.; Alves, C. & Magalhães-Castro, B., 1981. Exudate-eating, scent-marking, and territoriality in wild populations of marmosets. **Animal Behavior**, 29: 306-307.

83.Lacher, T. E.; Fonseca, G. A. B.; Alves, J. & Magalhães-Castro, B., 1984. Parasitism of trees by marmosets in a central Brazilian gallery forest. **Biotropica**, 16: 202-209.

84.Lacher, T. E.; Mares, M. A. & Alho, C. J. R., 1989. The structure of a small mammal community in a central Brazilian savanna. *In*: Redford, K. H. & Eisenberg, J. F. (Eds.). **Advances in neotropical mammalogy**. Sandhill Crane, Gainesville, Florida. p. 137-162.

85.Landim, M. F. & Hay, J. D., 1996. Impacto do fogo sobre alguns aspectos da biologia reprodutiva de *Kielmeyera coriacea* Mart. **Revista Brasileira de Biologia**, 56: 127-134.

86.Leeuwenberg, F. & Resende, S. L., 1994. Ecologia de cervídeos na Reserva Ecológica do IBGE, DF: Manejo e densidade de populações. **Cadernos de Geociências**, 11: 89-95.

87.Leite, L. L., 1996. Densidade global e infiltração de água no solo em área de cerrado submetida à queima controlada no Distrito Federal, Brasil. *In*: Miranda, H. S.; Saito, C. H. & Dias, B. F. S. (Eds.). **Impactos de queimadas em áreas de cerrado e restinga**. Universidade de Brasília, Brasília-DF. p. 31-36.

88.Locks, M., 1981. Nova espécie de *Oecomys* de Brasília, DF, Brasil (Cricetidae Rodentia). **Boletim do Museu Nacional, Nova Série, Zoologia**, 300: 1-5.

89.Lombardi, J. A. & Motta, J. C., 1993. Seed dispersal of *Solanum lycocarpum* St. Hil. (Solanaceae) by the maned wolf, *Chrysocyon brachyurus* Illiger (Mammalia, Canidae). **Ciência e Cultura**, 45: 126-127.

90.Lopes, G. P. P. & Heringer, E. P., 1981. Alguns fungos pouco conhecidos e sete espécies novas em folhas de plantas do planalto central brasileiro. **Arquivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro**, 25: 73-116.

91.Lucarelli, H. Z., 1992. Reserva Ecológica do IBGE. **Cadernos de Geociências**, 8: 180-187.

92.Mares, M. A.; Braun, J. K. & Gettinger, D., 1989. Observations on the distribution and ecology of the mammals of the cerrado grasslands of central Brazil. **Annals of Carnegie Museum**, 58: 1-60.

93.Mares, M. A. & Ernest, K. A., 1995. Population and community ecology of small mammals in a gallery forest of central Brazil. **Journal of Mammalogy**, 76: 750-768.

94.Mares, M. A.; Ernest, K. A. & Gettinger, D., 1986. Small mammals community structure and composition in the cerrado province of central Brazil. **Journal of Tropical Ecology**, 2: 301-325.

95.Marinho-Filho, J. S. & Reis, M. L., 1989. A fauna de mamíferos associada às matas de galeria. *In*: Barbosa, L. M. (Ed.). **Simpósio sobre mata ciliar - Anais da Fundação Cargill**. Fundação Cargill, Campinas. p. 46-60.

96.Marinho-Filho, J. S.; Reis, M. L.; Oliveira, P. S.; Vieira, E. M. & Paes, M. N., 1994. Diversity standards and small mammal numbers: conservation of the cerrado biodiversity. **Anais da Academia Brasileira de Ciências**, 66: 149-157.

97.Marini, M. A., 1992. Foraging behavior and diet of the helmeted manakin. **Condor**, 94: 151-158.

98.Marini, M. A., 1992. Notes on the breeding and reproductive biology of the helmeted manakin. **Wilson Bulletin**, 104: 168-173.

99.Marini, M. A. & Cavalcanti, R. B., 1990. Migrações de *Elaenia albiceps chilensis* e *Elaenia chiriquensis albivertex* (Aves: Tyrannidae). **Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, série Zoologia**, 6: 59-67.

100.Marini, M. A. & Cavalcanti, R. B., 1992. Mating system of the helmeted manakin *Antilophia galeata*. **Auk**, 109: 911-913.

101.Marini, M. A. & Cavalcanti, R. B., 1993. Habitat and foraging substrate use of three *Basileuterus* warblers from central Brazil. **Ornithologia Neotropical**, 4: 69-76.

102.Marini, M. A. & Cavalcanti, R. B., 1994. Nests and eggs of the white-striped warbler, *Basileuterus leucophrys*. **Ornithologia Neotropical**, 6: 117-118.

103.Marini, M. A. & Cavalcanti, R. B., 1996. Influência do fogo na avifauna do sub-bosque de uma mata de galeria do Brasil central. **Revista Brasileira de Biologia**, 56: 749-754.

104.Mazzei, L. J.; Rezende, A. V.; Felfili, J. M.; Franco, A. C.; Souza e Silva, J. C.; Cornachia, G. & Silva, M. A., 1997. Comportamento de plântulas de *Ormosia stipularis* Ducke submetida a diferentes níveis de sombreamento em viveiro. *In*: Leite, L. L. & Saito, C. H. (Eds.). **Contribuição ao conhecimento ecológico do cerrado**. Departamento de Ecologia, Universidade de Brasília, Brasília-DF. p. 64-70.

105.Medeiros, R. A. & Haridasan, M., 1985. Seasonal variation in the foliar concentrations of nutrients in some aluminum accumulating and nonaccumulating species of the region of central Brazil. **Plant and Soil**, 88: 433-436.

106.Meirelles, M. L. & Luiz, A. J. B., 1995. Padrões espaciais de árvores de um cerrado em Brasília DF. **Revista Brasileira de Botânica**, 18: 185-189.

107.Mello, D. A. & Moojen, L. E., 1979. Nota sobre uma coleção de roedores e marsupiais de algumas regiões do cerrado do Brasil central. **Revista Brasileira de Pesquisas Médicas e Biológicas**, 12: 287-291.

108.Milhomem, M. S.; Morais, H. C.; Diniz, I. R. & Hay, J. D., 1997. Espécies de lagartas em *Erythroxylum* spp. (erythroxylaceae) em um cerrado de Brasília. *In*: Leite, L. L. & Saito, C. H. (Eds.). **Contribuição ao conhecimento ecológico do cerrado**. Departamento de Ecologia, Universidade de Brasília, Brasília-DF. p. 107-111.

109.Mill, A. E., 1981. Observations on the ecology of *Pseudomyrmex termitarius* (F. Smith) (Hymenoptera: Formicidae) in Brazilian savannas. **Revista Brasileira de Entomologia**, 25: 271-274.

110.Mill, A. E., 1983. Behavioural and toxic effects of termite defensive secretions on ants. **Physiological Entomology**, 8: 413-418.

111.Miranda, A. C.; Miranda, H. S.; Dias, I. F. O. & Dias, B. F. S., 1993. Soil and air temperatures during cerrado fires in central Brazil. **Journal of Tropical Ecology**, 9: 313-320.

112.Miranda, G. H. B., 1997. Observações preliminares sobre a atividade do mico estrela (*Callithrix penicillata*) no cerrado denso e cerradão da Reserva Ecológica do IBGE, Brasília, DF. *In*: Leite, L. L. & Saito, C. H. (Eds.). **Contribuição ao conhecimento ecológico do cerrado**. Departamento de Ecologia, Universidade de Brasília, Brasília-DF. p. 241-245.

113.Miranda, H. S.; Rocha e Silva, E. P. & Miranda, A. C., 1996. Comportamento do fogo em queimadas de campo sujo. *In*: Miranda, H. S.; Saito, C. H. & Dias, B. F. S. (Eds.). **Impactos de queimadas em áreas de cerrado e restinga**. Universidade de Brasília, Brasília-DF. p. 1-10.

114.Miranda, M. I. & Klink, C. A., 1996. Influência do fogo na alocação de biomassa de *Echinolaena inflexa* em duas áreas de campo sujo de cerrado. *In*: Miranda, H. S.; Saito, C. H. & Dias, B. F. S. (Eds.). **Impactos de queimadas em áreas de cerrado e restinga**. Universidade de Brasília, Brasília-DF. p. 37-45.

115.Miranda, M. I. & Klink, C. A., 1996. Colonização de campo sujo de cerrado com diferentes regimes de queima pela gramínea *Echinolaena inflexa* (Poaceae). *In*: Miranda, H. S.; Saito, C. H. & Dias, B. F. S. (Eds.). **Impactos de queimadas em áreas de cerrado e restinga**. Universidade de Brasília, Brasília-DF. p. 46-52.

116.Morais, H. C., 1994. Coordinated group ambush: A new predatory behaviour in *Azteca* ants (Dolichoderinae). **Insectes Sociaux**, 41: 339-342.

117.Morais, H. C.; Diniz, I. R. & Baumgarten, L. C., 1995. Padrões de produção de folhas e sua utilização por larvas de Lepidoptera em um cerrado de Brasília. **Revista Brasileira de Botânica**, 18: 165-172.

118.Morais, H. C.; Diniz, I. R. & Silva, J. R., 1996. Larvas de *Siderone marthesia nemesis* (Illiger) (Lepidoptera: Nymphalidae, Charaxinae) em cerrado de Brasília, Distrito Federal, Brasil. **Revista Brasileira de Zoologia**, 13: 351-356.

119.Moreira, A. G., 1996. Proteção contra o fogo e seu efeito na distribuição e composição de espécies de cinco fisionomias de cerrado. *In*: Miranda, H. S.; Saito, C. H. & Dias, B. F. S. (Eds.). **Impactos de queimadas em áreas de cerrado e restinga**. Universidade de Brasília, Brasília-DF. p. 112-121.

120.Moreira, G. & Barreto, L., 1996. Alimentação e variação sazonal na freqüência de capturas de anuros em duas localidades do Brasil central. **Revista Brasileira de Zoologia**, 13: 313-320.

121.Morosini, I. B. A. & Klink, C. A., 1997. Interferência do capim gordura (*Melinis minutiflora* Beauv.) no desenvolvimento de plântulas de embaúba (*Cecropia pachystachya* Trecul.). *In*: Leite, L. L. & Saito, C. H. (Eds.). **Contribuição ao conhecimento ecológico do cerrado**. Departamento de Ecologia, Universidade de Brasília, Brasília-DF. p. 82-86.

122.Murakami, E. A. & Klink, C. A., 1996. Efeito do fogo na dinâmica de crescimento e reprodução de *Echinolaena inflexa* (Poiret) Chase (Poaceae). *In*: Miranda, H. S.; Saito, C. H. & Dias, B. F. S. (Eds.). **Impactos de queimadas em áreas de cerrado e restinga**. Universidade de Brasília, Brasília-DF. p. 53-60.

123.Nascimento, M. T., 1996. Rapid resprouting following fire in juveniles of *Metrodorea pubescens* (Rutaceae) in a mesophytic forest in central Brazil. **Ciência e Cultura**, 48: 182-183.

124.Nascimento, M. T. & Hay, J. D., 1990. Variação intraespecífica dos nutrientes em folhas de *Metrodorea pubescens* (Rutaceae) em dois tipos de mata do Distrito Federal. **Acta Botânica Brasílica**, 4: 145-152.

125.Nascimento, M. T. & Hay, J. D., 1993. Intraespecific variation in herbivory on *Metrodorea pubescens* (Rutaceae) in two forest types in Central Brazil. **Revista Brasileira de Biologia**, 53: 143-153.

126.Nascimento, M. T. & Hay, J. D., 1994. The impact of simulated folivory on juveniles of *Metrodorea pubescens* (Rutaceae) in a gallery forest near Brasília, Federal District, Brazil. **Journal of Tropical Ecology**, 10: 611-620.

127.Naves, M. A., 1996. Efeito do fogo na população de formigas (Hymenoptera-Formicidae) em cerrado do Distrito Federal. *In*: Miranda, H. S.; Saito, C. H. & Dias, B. F. S. (Eds.). **Impactos de queimadas em áreas de cerrado e restinga**. Universidade de Brasília, Brasília-DF. p. 170-177.

128.Naves, M. A. & Zanzini, A. C. S., 1997. Ocorrência de formigas (Hymenoptera: Formicidae) e sucesso de sobrevivência de algumas espécies de *Solenopsis* e *Pheidole* em ecossistemas antrópicos do cerrado. *In*: Leite, L. L. & Saito, C. H. (Eds.). **Contribuição ao conhecimento ecológico do cerrado**. Departamento de Ecologia, Universidade de Brasília, Brasília-DF. p. 174-178.

129.Negret, A. J., 1988. Fluxos migratórios na avifauna da Reserva Ecológica do IBGE, DF, Brasil. **Revista Brasileira de Zoologia**, 5: 209-214.

130.Negret, A. J. & Teixeira, D. M., 1984. The ocellated crake (*Mycropygia shomburgkii*) of central Brazil. **Condor**, 86: 220.

131.Neves, B. M. C. & Miranda, H. S., 1996. Efeitos do fogo no regime térmico do solo de um campo sujo de cerrado. *In*: Miranda, H. S.; Saito, C. H. & Dias, B. F. S. (Eds.). **Impactos de queimadas em áreas de cerrado e restinga**. Universidade de Brasília, Brasília-DF. p. 20-30.

132.Neves, B. M. C. & Miranda, H. S., 1996. Temperatura do solo em um campo sujo de cerrado durante uma queimada prescrita. *In*: Pereira, R. C. & Masser, L. C. B. (Eds.). **VIII Simpósio sobre o cerrado**. EMBRAPA/CPAC, Planaltina-DF. p. 396-399.

133.Nitikman, L. Z. & Mares, M. A., 1987. Ecology of small mammals in a gallery forest of central Brazil. **Annals of Carnegie Museum**, 56: 75-95.

134.Oliveira, P. & Gibbs, P. E., 1994. Pollination biology and breeding systems of six *Vochysia* species (Vochysiaceae) in central Brazil. **Journal of Tropical Ecology**, 10: 509-522.

135.Oliveira, P. E.; Gibbs, P. E.; Barbosa, A. A. & Talavera, S., 1992. Contrasting breeding systems in two *Eriotheca* (Bombacaceae) species of the Brazilian cerrados. **Plant Systematics and Evolution**, 179: 207-219.

136.Oliveira, P. E.; Gibbs, P. E. & Bianchi, M., 1991. Pollination and breeding biology of *Vellozia squamata* (Liliales-Velloziaceae): A species of the Brazilian cerrados. **Botanica Acta**, 104: 392-398.

137.Oliveira, P. S.; Klitzke, C. & Vieira, E., 1995. The ant fauna associated with the extrafloral nectaries of *Ouratea hexasperma* (Ochnaceae) in an area of cerrado vegetation in central Brazil. **Entomologist's Magazine**, 131: 77-82.

138.Oliveira-Filho, A. T. & Ratter, J. A., 1995. A study of the origin of central Brazilian forests by the analysis of plants species distribution patterns. **Edinbourgh Journal of Botany**, 52: 141-194.

139.Pereira, A. B. N. & Hay, J. D., 1986. Fotossíntese em *Caryocar brasiliense* no cerrado. **Revista Brasileira de Botânica**, 9: 259-262.

140.Pereira, B. A. S. & Filgueiras, T. S., 1988. Levantamento quantitativo das espécies invasoras da Reserva Ecológica do IBGE, Brasília, DF. **Cadernos de Geociências**, 1: 29-38.

141.Pereira, B. A. S.; Furtado, P. P.; Mendonça, R. C. & Rocha, G. I., 1989. Reserva Ecológica do IBGE (Brasília, DF): Aspectos históricos e fisiográficos. **Boletim da Fundação Brasileira para Conservação da Natureza**, 24: 30-43.

142.Pereira, B. A. S.; Silva, M. A. & Mendonça, R. C., 1993. **Reserva ecológica do IBGE, Brasília, DF - Lista de plantas vasculares**. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Rio de Janeiro. 43 p.

143.Pinheiro, C. E. G. & Ortiz, J. V. C., 1992. Communities of fruit-feeding butterflies along a vegetation gradient in central Brazil. **Journal of Biogeography**, 19: 505-511.

144.Pinheiro, F.; Morais, H. C. & Diniz, I. R., 1997. Composição de herbívoros em plantas hospedeiras com látex: Lepidoptera em *Kielmeyera* spp. (Guttiferae). *In*: Leite, L. L. & Saito, C. H. (Eds.). **Contribuição ao conhecimento ecológico do cerrado**. Departamento de Ecologia, Universidade de Brasília, Brasília-DF. p. 101-106.

145.Poth, M.; Anderson, I. C.; Miranda, H. S.; Miranda, A. C. & Riggan, P., 1995. The magnitude and persistence of soil NO, N2O, CH4, and CO2 fluxes from burned tropical savanna in Brazil. **Global Biogeochemical Cycles**, 9: 503-513.

146.Prada, M.; Marini-Filho, O. J. & Price, P. W., 1995. Insects in flower heads of *Aspilia foliacea* (Asteraceae) after a fire in a central Brazilian savanna: Evidence for the vigor hypothesis. **Biotropica**, 27: 513-518.

147.Price, P. W.; Diniz, I. R.; Morais, H. C. & Marques, E. S. A., 1995. The abundance of insect herbivore species in the tropics: High local richness of rare species. **Biotropica**, 27: 468-478.

148.Proença, C. E. B. & Gibbs, P. E., 1994. Reproductive biology of eight sympatric Myrtaceae from central Brazil. **New Phytologist**, 126: 343-354.

149.Ratter, J. A., 1986. **Notas sobre a vegetação da Fazenda Água Limpa, Brasília, DF**. Textos Universitários, nº 3, Editora UnB, Brasília-DF. 136 p.

150.Ratter, J. A.; Bridgewater, S.; Atkinson, R. & Ribeiro, J. F., 1996. Analysis of the floristic composition of the Brazilian Cerrado vegetation II: Comparison of the woody vegetation of 98 areas. **Edinbourgh Journal of Botany**, 53: 153-180.

151.Ratter, J. A. & Dargie, T. C. D., 1992. An analysis of the floristic composition of 26 cerrado areas in Brazil. **Edinburgh Journal of Botany**, 49: 235-250.

152.Raw, A., 1996. Estimativa preliminar do número de térmitas nos cerrados. *In*: Pereira, R. C. & Nasser, L. C. B. (Eds.). **VIII Simpósio sobre o cerrado**. EMBRAPA/CPAC, Planaltina-DF. p. 165-168.

153.Raw, A. & Hay, J. D., 1985. Fire and others factors affecting a population of *Simarouba amara* in cerradão near Brasília, Brazil. **Revista Brasileira de Botânica**, 8: 101-107.

154.Reid, J. W., 1984. Semiterrestrial meiofauna inhabiting a wet campo in central Brazil, with special reference to the copepoda (Crustaceae). **Hydrobiologia**, 118: 95-111.

155.Reid, J. W., 1987. The cyclopoid copepods of a wet campo marsh in central Brazil. **Hydrobiologia**, 153: 121-138.

156.Reid, J. W., 1993. The harpacticoid and cyclopoid copepod fauna in the cerrado region of central Brazil. 1. Species composition, habitats, and zoogeography. **Acta Limnologica Brasiliensia**, 6: 56-68.

157.Reid, J. W., 1993. The harpacticoid and cyclopoid copepod fauna in the cerrado region of Central Brazil. 2. Community structures. **Acta Limnologica Brasiliensia**, 6: 69-81.

158.Reid, J. W., 1993. Two new species of copepods (Copepoda: Harpacticoida: Canthocamptidae) of particular biogeographical interest from central Brazil. **Nauplius**, 1: 13-38.

159.Reid, J. W., 1994. *Murunducaris juneae*, new genus, new species (Copepoda: Harpacticoida: Parastenocarididae) from a wet campo in central Brazil. **Journal of Crustacean Biology**, 14: 771-781.

160.Riggan, P. J.; Brass, J. A. & Lockwood, R. N., 1993. Assessing fire emissions from tropical savanna and forests of central Brazil. **Photogrammetric Engineering and Remote Sensing**, 59: 1009-1015.

161.Rocha, D. M. S. & Macdowell, S., 1997. Identificação de clones de *Pterodon pubescens* Benth. (Leguminosae, Papilionoidae) através da utilização da técnica de RAPD. *In*: Leite, L. L. & Saito, C. H. (Eds.). **Contribuição ao conhecimento ecológico do cerrado**. Departamento de Ecologia, Universidade de Brasília, Brasília-DF. p. 309-315.

162.Rodrigues, F. H. G. & Marinho-Filho, J. S., 1995. Feeding on a marsh-living herbaceous plant by black howler monkeys (*Alouatta caraya*) in central Brazil. **Folia Primatologica**, 65: 115-117.

163.Santee, D. P. & Faria, D. S., 1985. Padrões de comportamento utilizados pelos saguis (*Callithrix jacchus penicillata*) na retirada do exsudato. **Psicologia**, 11: 65-74.

164.Sato, M. N. & Miranda, H. S., 1996. Mortalidade de plantas lenhosas do cerrado após duas queimadas prescritas. *In*: Pereira, R. C. & Masser, L. C. B. (Eds.). **VIII Simpósio sobre o cerrado**. EMBRAPA/CPAC, Planaltina-DF. p. 204-207.

165.Sato, M. N. & Miranda, H. S., 1996. Mortalidade de plantas lenhosas do cerrado *sensu stricto* submetidas a diferentes regimes de queima. *In*: Miranda, H. S.; Saito, C. H. & Dias, B. F. S. (Eds.). **Impacto de queimadas em áreas de cerrado e restinga**. Departamento de Ecologia, Universidade de Brasília, Brasília-DF. p. 102-111.

166.Scherrer, S.; Diniz, I. R. & Morais, H. C., 1997. Caracterização da fauna de parasitóides (Hymenoptera) de lagartas, no cerrado de Brasília. *In*: Leite, L. L. & Saito, C. H. (Eds.). **Contribuição ao conhecimento ecológico do cerrado**. Departamento de Ecologia, Universidade de Brasília, Brasília-DF. p. 131-134.

167.Seabra, H. F.; Encinas, J. I. & Felfili, J. M., 1991. Análise estrutural da mata ciliar do Córrego Capetinga - DF, habitat de *Callithrix jacchus penicillata*. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, 26: 11-17.

168.Senna, P. A. C. & Ferreira, L. V., 1987. Nostocophyceae (Cyanophyceae) da Fazenda Água Limpa, Distrito Federal, Brasil 2: famílias Nostocaceae, Scytonemataceae e Stigonemataceae. **Rickia**, 14: 7-19.

169.Seyffarth, J. A. S.; Calouro, A. M. & Price, P. W., 1996. Leaf rollers in *Ouratea hexasperma* (Ochnaceae): Fire effect and the plant vigor hypothesis. **Revista Brasileira de Biologia**, 56: 135-137.

170.Silva, D. A. & Klink, C. A., 1997. Crescimento e alocação de biomassa de duas gramíneas nativas do cerrado. *In*: Leite, L. L. & Saito, C. H. (Eds.). **Contribuição ao conhecimento ecológico do cerrado**. Departamento de Ecologia, Universidade de Brasília, Brasília-DF. p. 59-63.

171.Silva, D. M. S.; Hay, J. D. & Morais, H. C., 1996. Sucesso reprodutivo de *Byrsonima crassa* (Malpighiaceae) após uma queimada em um cerrado de Brasília-DF. *In*: Miranda, H. S.; Saito, C. H. & Dias, B. F. S. (Eds.). **Impactos de queimadas em áreas de cerrado e restinga**. Universidade de Brasília, Brasília-DF. p. 122-127.

172.Silva, E. P. R. & Miranda, H. S., 1996. Temperatura do câmbio de espécies lenhosas do cerrado durante queimadas prescritas. *In*: Pereira, R. C. & Masser, L. C. B. (Eds.). **VIII Simpósio sobre o cerrado**. EMBRAPA/CPAC, Planaltina-DF. p. 253-257.

173.Silva, G. T.; Sato, M. N. & Miranda, H. S., 1996. Mortalidade de plantas lenhosas do cerrado *sensu stricto* submetidas a diferentes regimes de queima. *In*: Miranda, H. S.; Saito, C. H. & Dias, B. F. S. (Eds.). **Impactos de queimadas em áreas de cerrado e restinga**. Universidade de Brasília, Brasília-DF. p. 102-111.

174.Silva, G. T.; Sato, M. N.; Miranda, H. S. & Furtado, D. A., 1996. Mortalidade de plantas lenhosas em campo sujo submetido a queimadas prescritas. *In*: Pereira, R. C. & Nasser, L. C. B. (Eds.). **VIII Simpósio sobre o cerrado**. EMBRAPA/CPAC, Planaltina-DF. p. 208-212.

175.Smith, D. R., 1981. Symphita (Hymenoptera: Pergidae, Argidae, Tenthredinidae) collected at the Reserva Ecológica do IBGE, Brasília, DF. **Revista Brasileira de Entomologia**, 25: 275-288.

176.Smith, D. R., 1995. Rediscovery of *Corynophilus pumilus* (Klug), and a new genus and two species of Symphyta from South America (Hymenoptera: Pergidae & Xiphydriidae). **Revista Brasileira de Entomologia**, 39: 161-170.

177.Teixeira, D. M. & Negret, A. J., 1984. The Dwarf Tinamou (*Tanoniscus nanus*) of central Brazil. **Auk**, 101: 188-189.

178.Vieira, E. M., 1993. Occurrence and prevalence of bot flies, *Metacuterebra apicalis* (Diptera: Cuterebridae), in rodents of cerrado from central Brazil. **Journal of Parasitology**, 79: 792-795.

179.Vieira, E. M.; Andrade, I. & Price, P. W., 1996. Fire effects on a *Palicourea rigida* (Rubiaceae) Gall Midge: A test of the plant vigor hypothesis. **Biotropica**, 28: 210-217.

180.Vieira, E. M. & Baumgarten, L. C., 1995. Daily activity patterns of small mammals in a cerrado area from central Brazil. **Journal of Tropical Ecology**, 11: 255-262.

181.Vieira, E. M. & Palma, A. R. T., 1996. Natural history of *Thylamys velutinus* (Marsupialia, Didelphidae) in central Brazil. **Mammalia**, 60: 481-484.

ÍNDICE DE AUTORES:

Alho, C. J. R.: 1; 2; 71; 81; 84
Alves, C.: 82
Alves, J.: 83
Alves, M. A. S.: 3; 4; 21
Anderson, I. C.: 145
Andrade, I.: 5; 179
Andrade, S. M. A.: 6
Araujo Neto, M. D.: 8
Araújo, A. F. B.: 7
Atkinson, R.: 150
Azevedo, F. C. C.: 9
Barbosa, A. A.: 135
Barreto, E. J. M.: 68
Barreto, L.: 120
Barros, M. A. G.: 10
Batmanian, G. J.: 11
Baumgarten, L. C.: 117; 180
Bianchi, M.: 136
Bizerril, M. X. A.: 12; 13; 72
Brass, J. A.: 160
Braun, J. K.: 92
Bridgewater, S.: 150
Brossard, M.: 27
Bustamante, M. M. C.: 14; 15; 16; 80
Caldas, L. S.: 65; 77
Calouro, A. M.: 169
Castro, A. A.: 15; 80
Causin, H. F.: 16
Cavalcanti, R. B.: 17; 21; 99; 100; 101; 102; 103
Cavedon, A. D.: 18
César, H. L.: 19
Cintra, R.: 20; 21
Coles de Negret, H. R.: 22
Collevatti, R. G.: 23
Cornachia, G.: 104
Costa, E. M. M.: 7
Coutinho, L. M.: 24
Cummings, D. L.: 78
Dargie, T. C. D.: 151
Dias, B. F. S.: 25; 111
Dias, I. F. O.: 26; 111
Dias, V. S.: 27
Diniz, I. R.: 5; 28; 29; 108; 117; 118; 144; 147; 166

Domingos, D. J.: 30; 31
Duarte, G. F.: 14; 15; 80
Egler, I.: 32; 81
Eiten, G.: 33
Encinas, J. I.: 34; 35; 49; 65; 167
Ernest, K. A.: 36; 60; 93; 94
Faria, D. S.: 37; 38; 39; 40; 163
Felfili, J. M.: 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 104; 167
Felfili, M. C.: 49
Ferrari, K.: 7
Ferreira, L. V.: 168
Filgueiras, T. S.: 44; 50; 140
Fonseca, G. A. B.: 51; 52; 53; 82; 83
Franco, A. C.: 54; 55; 77; 104
Fundação Zoobotânica.: 56
Furley, P. A.: 8; 57; 58
Furtado, D. A.: 174
Furtado, P. P.: 141
Gastal, M. L. A.: 9; 12
Gettinger, D.: 59; 60; 61; 92; 94
Gibbs, P. E.: 134; 135; 136; 148
Gifford, D. R.: 19
Gribel, R.: 61; 62; 63
Haridasan, M.: 8; 11; 32; 44; 64; 65; 66; 67; 105
Hay, J. D.: 23; 48; 63; 68; 85; 108; 124; 125; 126; 139; 153; 171
Heinze, J.: 69
Henriques, R. P. B.: 70; 71; 72; 73
Heringer, E. P.: 74; 90
Hill, P. G.: 66
Hoffman, W. A.: 75; 76
Holldobler, B.: 69
Johnson, C. E.: 8; 77
Kauffman, J. B.: 78
Kitayama, K.: 73; 79
Klink, C. A.: 114; 115; 121; 122; 170
Klitzke, C.: 137
Kohlsdorf, T.: 72
Kozovits, A. R.: 14; 15; 80
Lacher, T. E.: 51; 81; 82; 83; 84
Landim, M. F.: 85
Leeuwenberg, F.: 86
Leite, L. L.: 87
Locks, M.: 88
Lockwood, R. N.: 160
Lombardi, J. A.: 89

Lopes Assad, M. L.: 27
Lopes, G. P. P.: 90
Lucarelli, H. Z.: 91
Luiz, A. J. B.: 106
Macdowell, S.: 161
Machado, J. W. B.: 48
Magalhães, J. R.: 80
Mares, M. A.: 36; 81; 84; 92; 93; 94; 133
Marini, M. A.: 17; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103
Marques, E. S. A.: 147
Mazzei, L. J.: 104
Medeiros, R. A.: 105
Meirelles, M. L.: 106
Mello, D. A.: 107
Mendonça, R. C.: 44; 141; 142
Milhomem, M. S.: 108
Mill, A. E.: 109; 110
Miranda, A. C.: 26; 111; 113; 145
Miranda, G. H. B.: 112
Miranda, H. S.: 6; 26; 111; 113; 131; 132; 145; 164; 165; 172; 173; 174
Miranda, M. I.: 114; 115
Monti, E. R.: 35
Moojen, L. E.: 107
Morais, H. C.: 5; 28; 29; 108; 116; 117; 118; 144; 147; 166; 171
Moreira, A. G.: 119
Moreira, G.: 120
Morosini, I. B. A.: 121
Motta, J. C.: 89
Murakami, E. A.: 122
Nardoto, G. B.: 54; 55
Nascimento, M. T.: 123; 124; 125; 126
Naves, M. A.: 127; 128
Negret, A. J.: 129; 130; 177
Neves, B. M. C.: 131; 132
Nitikman, L. Z.: 133
Nogueira, P. E.: 49
Oliveira, P. E.: 135; 136
Oliveira, P. S.: 69; 96; 137
Oliveira, P.: 134
Oliveira, R. F.: 7
Ortiz, J. V. C.: 143
Paes, M. N.: 96
Palma, A. R. T.: 181
Paula, J. E.: 74
Paviani, T. I.: 67

Pereira, A. B. N.: 139
Pereira, B. A. S.: 50; 140; 141; 142
Pereira, L. A.: 53
Pinheiro, C. E. G.: 143
Pinheiro, F.: 144
Poth, M.: 145
Prada, M.: 146
Price, P. W.: 146; 147; 169; 179
Proença, C. E. B.: 148
Ratter, J. A.: 138; 149; 150; 151
Raw, A.: 13; 152; 153
Redford, K. H.: 22; 52; 53
Reid, J. W.: 154; 155; 156; 157; 158; 159
Reis, M. L.: 95; 96
Resende, S. L.: 86
Rezende, A. V.: 44; 48; 49; 104
Ribeiro, J. F.: 150
Riggan, P. J.: 160
Riggan, P.: 145
Rocha e Silva, E. P.: 113
Rocha, D. M. S.: 161
Rocha, G. I.: 141
Rocha, I. R. D.: 73
Rodrigues, F. H. G.: 162
Russell, D.: 66
Sambuichi, H. R.: 33
Santee, D. P.: 163
Sato, M. N.: 164; 165; 173; 174
Scherrer, S.: 166
Schiavini, I.: 67
Seabra, H. F.: 167
Senna, P. A. C.: 168
Seyffarth, J. A. S.: 169
Silva, D. A.: 170
Silva, D. M. S.: 171
Silva, E. P. R.: 172
Silva, G. T.: 173; 174
Silva, J. R.: 118
Silva, L. F.: 14; 15; 80
Silva, M. A.: 49; 104; 142
Silva, M. C.: 44; 45; 46; 47; 48; 49
Silva, P. E. N.: 48
Simon, M. F.: 7
Smith, D. R.: 175; 176
Sommer, S.: 18

Souza e Silva, J. C.: 104
Souza, M. P.: 54; 55
Talavera, S.: 135
Teixeira, D. M.: 130; 177
Trunzer, B.: 69
Vieira, E. M.: 96; 178; 179; 180; 181
Vieira, E.: 137
Walter, B. M. T.: 48; 49
Ward, D. E.: 78
Zanzini, A. C. S.: 128

ÍNDICE DE ASSUNTOS:

Ácaros: 59; 61
Acasalamento: 100
Água:
  Infiltração No Solo: 87
  Potencial Hídrico: 54
Algas: 168
Alocação De Biomassa: 114; 170
Alouatta Caraya: 162
Alumínio, Acumulação De: 64; 66; 67; 105
Amônia: 80
Anfíbios: 120
Antilophia Galeata: 97; 98; 100
Antrópicos, Ecossistemas: 128
Anuros: 120
Apidae: 70
Área De Vida: 36; 39
Argidae: 175
  Armitermes Euamignathus: 30 : 31
Arquitetura: 23
Artiodáctilos: 86
Aspilia Foliaceae: 146
Assimilação De Nitrato: 14; 15; 80
Asteraceae: 146
Atividade Diária: 112; 180
Aves: 130; 177
  Comportamento: 3; 4; 97
  Dieta: 4; 21; 97
  Habitat: 101
  Influência Do Fogo: 103
  Massa Corporal: 17
  Mata Galeria: 103
  Migração: 99; 129
  Ninhos: 102
  Reprodução: 20; 98
  Sistema Social: 3
  Uso Do Substrato: 101
Azteca: 116
Basileuterus : 101
  Basileuterus Leucophrys: 102
Berne: 178
Biogeografia : 44; 158
  Zoogeografia: 156
Biologia Reprodutiva: 85; 98; 136; 148

Biogia Da Polinização: 134; 136
Biomassa: 78; 114; 170
Bombacaceae: 62; 135
Borboletas (Veja Lepidópteros)
Brotação: 123
Bugio: 162
Byrsonima : 5; 10
B Yrsonima Crassa: 171
Callithrix Penicillata (= *Callithrix Jacchus Penicillata*) : 37; 38; 39; 40; 51; 83; 112; 163; 167
Árvores Gomíferas: 38
Atividade: 112
Área De Vida: 39
Comportamento: 37; 163
Exsudatos : 51; 82; 83; 163
Grupo Social, Composição De: 39
Habitat: 167
Marcação Odorífera: 82
Parasitismo De Árvores: 83
Territorialidade: 82
Caluromys Lanatus: 62
Campo:
Campo Sujo
Colonização Por *Echinolaena Inflexa*: 115
Comportamento Do Fogo: 113
Comunidade De Cupins: 81
Dinâmica De Combustível: 6
Estabelecimento E Crescimento De *Dalbergia Miscolobium*: 55
Fogo, Efeito Em:
Alocação De Biomassa: 114
Regime Térmico: 131
Flora Indicadora: 19
Microclimas: 26
Mortalidade De Plantas Lenhosas: 174
Temperatura Do Solo: 132
Campo Úmido: 8; 58; 154; 155; 159
Canidae: 9; 89
Canthocamptidae: 158
Capim Gordura: 121
Carnívoros: 9; 89
Caryocar Brasiliense: 63; 139
Caryocaraceae: 63; 139
Cátions, Em Tecidos Foliares: 66
Cebidae: 162
Cecropia Pachystachya: 121

Cecropiaceae: 121
Cerconota Achatina: 5
Cerradão:
  Atividade De Micos: 112
  Exsudatos: 51
  Fogo: 153
  População De *Simarouba Amara*: 153
Cerrado: 49
  Atividade De Micos: 112
  Coeficiente De Volume: 35
  Distribuição De Diâmetros: 45
  Efeito De Geada: 50
  Efeito Do Fogo: 33
  Fitossociologia: 46; 48
  Florística: 46; 48
  Mortalidade De Plantas: 164; 165; 173
  Padrões Espaciais De Árvores: 106
  Vegetação: 47; 48
Cervidae: 86
Ch_4: 145
Chrysocyon Brachyurus: 9; 89
Citrus Reticulata: 79
Clones, Identificação De: 161
Co_2: 145
Cobertura, Efeitos Sobre Estabelecimento De Plântulas: 76
Coccidae: 79
Coeficiente De Volume: 35
Colonização: 115
Columbidae: 20; 21
Columbiformes: 20; 21
Columbina Talpacoti: 21
Combustível:
  Dinâmica: 6
  Queimada Prescrita: 6
Complexidade Do Habitat: 1
Comportamento : 36; 37
  De Ajuda: 3
  Forrageamento: 4; 97
  Predatório: 116
  Retirada De Exsudato: 163
  Social: 39
Composição Florística (Veja Florística)
Comunidades:
  Borboletas: 143
  Cupins: 81

Dinâmica: 25
Ectoparasitas: 60
Estrutura: 25; 60; 84; 94; 157
Pequenos Mamíferos: 60; 84; 93; 94
Produção Primária: 11
Vegetais: 11; 57
Conservação: 96
Copépodes: 154; 155; 156; 157; 158; 159
Corynophilus Pumilus: 176
Crescimento(De Plantas): 43; 55; 122; 170
Cricetidae: 36; 88
Crustáceos: 154; 155; 156; 157; 158; 159
Cupins (Veja Isópteros)
Cuterebridae: 178
Cyanophyceae: 168
Dalbergia Miscolobium: 55
Demografia: 75
Dendrometria: 74
Didelphidae: 53; 62; 181
Didelphis Albiventris: 53
Dieta: 4; 9; 13; 21; 30; 97; 120
Exsudatos: 38; 51; 82
Frugívoria: 12
Dípteros: 178
Dispersão De Sementes: 89
Distribuição:
De Diâmetros: 45
De Espécies De Animais: 92
De Espécies De Plantas: 138
De Murundus: 58
Espacial: 31; 106; 119
Diversidade: 1; 33; 42; 52; 96
Echinolaena Inflexa: 114; 115; 122
Ecologia Reprodutiva: 20
Ecologia Da Polinização: 63
Ecossistemas Antrópicos: 128
Ectoparasitas: 59; 60; 61; 178
Edáfica, Macrofauna: 27
Elaenia Albiceps Chilensis: 99
Elaenia Chiriquensis Albivertex: 99
Embaúba: 121
Emberizidae: 4
Enroladores De Folhas: 169
Eriotheca: 135
Erythroxylaceae: 108

Erythroxylum: 108
Espécies:
Invasoras: 140
Lenhosas: 14; 15; 16; 80
Raras: 147
Estratégias Reprodutivas: 10
Eucalipto: 65
Exsudatos & Árvores Gomíferas: 38; 51; 82; 83; 163
Fazenda Água Limpa (Veja Reservas)
Fenologia: 10; 12; 117
Fisionomias Do Cerrado: 2; 30; 31; 119
Fitossociologia: 41; 46; 48
Flora Indicadora De Fogo: 19
Floração: 10
Floresta (Veja Mata)
Florística:
Cerrado (*Sensu Lato*): 46; 150; 151
Cerrado (*Sensu Stricto*): 48
Mata Galeria: 41; 46
Fluxos De No, N2o, Ch4, Co2: 145
Folivoria: 126
Frugivoria: 12
Fogo:
Avifauna: 103
Biomassa: 78; 114
Brotação: 123
Colonização Por Gramínea: 115
Comportamento Do: 113
Composição De Espécies: 119
Comunidade
Dinâmica De: 25
Estrutura De: 25
Crescimento, Dinâmica De: 122
Demografia: 75
Diversidade De Plantas: 33
Ecologia Do: 24
Emissões De Florestas E Savanas: 160
Enroladores De Folhas: 169
Espécies Lenhosas: 80; 172
Estabelecimento De Plântulas: 76
Flora Indicadora: 19
Fluxos (No, N2o, Ch4, Co2): 145
Formigas: 127
Galhas: 179
Infiltração De Água: 87

Insetos Em Flores: 146
Lagartos: 7
Microclima: 26
Nutrientes: 78; 80
Periódico: 33
Plantas Lenhosas : 75
Mortalidade: 164; 165; 173; 174
População: 153
Prescrito: 172
Proteção Contra: 119
Regime Térmico Do Solo: 131
Reprodução: 85; 122; 171
Solo: 26; 131; 132; 145
Sucesso Reprodutivo: 171
Temperatura
Ar: 111
Cambio: 172
Solo: 111; 131; 132
Folhas:
Localização De Alumínio: 67
Fungos Em: 90
Nutrientes: 65; 105; 124
Padrões De Produção: 117
Folívoria: 126
Formigas:
Comportamento De Predação: 116
Ecologia: 109
Ecossitemas Antrópicos, Ocorrência Em: 128
Fogo, Efeito Do: 127
Nectários Extraflorais, Associação Com: 137
População: 127
Reprodução: 69
Secreção Defensiva De Cupins, Efeitos De: 110
Sobrevivência: 128
Forrageamento: 4; 97; 101
Fotossíntese: 15; 77; 139
Frugívoria: 12
Frutos: 12; 13
Fungos: 90
Galhas: 179
Geada, Efeito Na Flora: 50
Gigantolaelaps: 59
Gradiente De Vegetação: 78; 143
Gramíneas: 114; 115; 121; 122; 170
Gruiformes: 130

Guttiferae: 85; 144
Habitat:
  Complexidade: 1
  Componentes Quantitativos: 2
  Copépodes: 156
  Microhabitat: 71
  Seleção E Uso: 36; 71; 72; 101
  Simulada: 126
Herbívoros: 23; 47
Herbivoria: 125; 144
Himenópteros : 175; 176
  Comportamento De Predação: 116
  Ecologia: 109
  Ecossitemas Antrópicos, Ocorrência Em: 128
  Fogo, Efeito Do: 127
  Nectários Extraflorais, Associação Com: 137
  Ninhos: 70; 73
  Parasitóides: 166
  População: 127
  Reprodução: 69
  Secreção Defensiva De Cupins, Efeitos De: 110
  Sobrevivência: 128
Hipótese De Vigor Vegetal: 146; 169; 179
Historia Natural: 181
Homópteros: 79
Hospedeiros (Veja Também Parasitas)
  Animais: 59; 60; 61; 166; 178
  Plantas: 28; 29; 144
Ibge (Veja Reservas)
Idades, Comparação Entre: 21
Infiltração De Água: 87
Insetos : 118; 175; 176
  Abundância: 147
  Biologia: 22
  Comportamento De Predação: 116
  Comunidades: 143
  Dieta: 30
  Ecologia: 109
  Ecossitemas Antrópicos, Ocorrência Em: 128
  Flores: 146
  Fogo, Efeito Do: 127
  Gradiente De Vegetação, Ao Longo De: 143
  Hospedeiros:
    Animais: 166; 178
      Plantas : 5; 28; 29; 108; 117

Látex, Com: 144
Nectários Extraflorais, Associação Com: 137
Ninhos: 70; 73
Número: 152
Parasitóides: 166
População, Efeito Do Fogo Em: 127
Propriedades Do Solo, Alteração: 32
Reprodução: 69
Riqueza: 147
Secreções Defensivas: 110
Sobrevivência: 128
Inventario Florestal: 34
Invertebrados, Macrofauna Edáfica: 27
Isópteros:
Alimentos: 30
Biologia: 22
Comunidade, Composição: 81
Distribuição Espacial: 31
Ninhos: 31; 81
Numero: 152
Propriedades Do Solo, Alteração: 32
Secreções Defensivas: 110
Jardim Botânico De Brasília (Veja Reservas)
Kielmeyera: 144
Kielmeyera Coriacea: 85
Laelapidae: 59
Lagartos: 7
Látex, Herbívoros Em Plantas Com: 144
Latossolo: 32; 65
Leguminosae: 55; 104; 161
Lepidópteros:
Comunidades: 143
Gradiente De Vegetação, Ao Longo De: 143
Larvas (Lagartas) : 5; 28; 29; 108; 117; 118
Parasitóides: 166
Plantas Hospedeiras : 5; 28; 29; 117
Látex, Plantas Com: 144
Lobo Guará: 9; 89
Macrofauna Edáfica: 27
Malpighiaceae: 5; 10; 171
Mamíferos : 40; 167
Abundância: 1; 72
Alimentos: 9; 12; 13; 38; 51; 82; 83; 162; 163
Área De Vida: 36; 39
Atividade Diária: 112; 180

Comportamento: 36; 37; 163
Comunidade: 60; 84; 93; 94
Conservação: 96
Dispersão De Sementes: 89
Distribuição: 92
Diversidade: 1; 52; 96
Ecologia: 92; 133
Ectoparasitas: 60; 61; 178
Frugívoria: 12
Grupo Social, Composição De: 39
Historia Natural: 181
Manejo: 86
Marcação Odorífera: 82
Mata De Galeria: 12; 13; 37; 39; 52; 83; 95; 133
Parasitas: 60; 61; 178
Pequenos Mamíferos:
Marsupiais: 53; 62; 107; 181
Roedores: 36; 71; 88; 107; 178
Pequenos Mamíferos: 1; 60; 72; 84; 93; 94; 96; 133; 180
Polinização: 62
População: 1; 93
Reprodução: 36
Seleção (E Uso) De
Habitat: 36; 72
Microhabitat: 71
Territorialidade: 82
Marsupiais: 53; 62; 107; 181
Massa Corporal: 17
Mata: 125
Distribuição De Espécies, Padrões: 138
Mata De Galeria (Ou Ciliar)
Analise Estrutural: 167
Crescimento: 43
Dendrometria: 74
Dinâmica: 42
Diversidade: 42; 52
Estrutura: 42
Fenologia: 12
Fitosociologia: 41; 46
Florística: 41; 46
Folívoria: 126
Frutos: 12; 13
Mortalidade: 43
Recrutamento: 43
Mata Mesofítica: 123

Origem: 138
Meiofauna: 154
Melinis Minutiflora: 121
Metacuterebra Apicalis: 178
Metrodorea Pubescens: 123; 124; 125; 126
Microclima: 26
Microhabitat, Seleção De: 71
Migração: 99; 129
Morcegos (Veja Quirópteros)
Mortalidade De Plantas: 43; 68; 164; 165; 173; 174
Murunducaris Juneae: 159
Murundus: 8; 58
Mycropygia Shomburgkii: 130
Myrtaceae: 65; 148
Nectários Extraflorais, Associação Com: 137
Nectomys Squamipes: 36
Neothraupis Fasciata: 3; 4
Ninhos
Apidae: 70
Aves: 102
Isópteros: 31; 81
Vespidae: 73
Nitrogênio Em Plantas Lenhosas: 16
No, N_2o: 145
Nostococaceae: 168
Nostocophyceae: 168
Nutrientes
Acumulação: 11
Assimilação Por Espécies Lenhosas: 80
Concentração Foliar: 105; 124
Dinâmica: 78
Fluxos: 145
Foliares: 65; 105; 124
Variação Intraespecífica: 124
Variação Sazonal: 105
Nymphalidae: 118
Ochnaceae: 23; 137; 169
Oecomys: 88
Oecophoridae: 5
Ormosia Stipularis: 104
Ouratea Hexasperma: 23; 137; 169
Pachycondyla Villosa: 69
Palicourea Rigida: 179
Papilionidae: 161
Parasitismo (Veja Também Hospedeiros): 59; 60; 61; 83; 166; 178

Parasitóides: 166
Parastenocarididae: 159
Parulidae: 101; 102
Passeriformes: 3; 4; 97; 98; 99; 100; 101; 102
Perdiz: 177
Pergidae: 175; 176
Pheidole: 128
Piper Arboreum: 13
Piperaceae: 13
Pipridae: 97; 98; 100
Plantas:
  Hospedeiras: 5; 28; 29; 108; 144; 179
  Lenhosas: 75; 164; 165; 172; 173; 174
  Vasculares: 142
Plântulas:
  Desenvolvimento: 55; 121
  Efeitos Do Sombreamento: 104
  Estabelecimento: 76
  Interferência De Capim Gordura: 121
  Sobrevivência: 54
Poaceae: 114; 115; 122
Polinização: 10; 62; 63; 134; 136
População:
  Efeito Do Fogo: 153
  Cervídeos: 86
  Formigas: 127
  Pequenos Mamíferos: 1; 93
População: 1; 93; 127; 153
Potencial Hídrico: 54
Predação: 116
Preferencia Alimentar: 30
Procornitermes Araujoi: 32
Produção Primaria: 11
Pseudobombax Tomentosum: 62
Pseudomyrmex Termitarius: 109
Pterodon Pubescens: 161
Pula Pula: 101; 102
Pulvinaria Flavescens: 79
Queimada (Veja Fogo)
Quirópteros: 13; 61
Rallidae: 130
Rapd, Identificação De Clones Usando: 161
Ratos: 36; 88
Rebrota: 123
Recrutamento: 43

Regime Térmico: 131
Renealmia Alpinia: 12
Reprodução:
  Efeito Do Fogo: 122
  Insetos: 69
  Rato Da Água: 36
  Sistema: 135
Repteis: 7
Reservas
  Fazenda Água Limpa: 57; 149; 168
  Jardim Botânico De Brasília: 18; 56
  Reserva Ecológica Do Ibge: 52; 91; 140; 141; 142; 175
Resistência Foliar: 77
Riqueza De Espécies: 147
Roedores
  Área De Vida: 36
  Comportamento: 36
  Parasitas: 178
  Reprodução: 36
  Seleção De Habitat: 36
  Seleção De Microhabitat: 71
Roedores: 36; 71; 88; 107; 178
Rolinha: 20; 21
Rubiaceae: 179
Rutaceae: 79; 123; 124; 125; 126
Sagui (Veja *Callithrix*):
Sazonalidade: 105; 120
Scytonemataceae: 168
Seleção E Uso De
  Habitat: 36; 72
  Microhabitat: 71
Sexos, Comparação Entre: 21
Siderone Marthesia: 118
Simarouba Amara: 153
Sistema
  Reprodutivo: 100; 134; 135
  Social: 3
Solanaceae: 89
Solanum Lycocarpum: 89
Solenopsis: 128
Solo:
  Alteração Das Propriedades: 32
  Amônia: 80
  Biogeografia: 44
  Da Fazenda Água Limpa: 57

Densidade: 87
Do Jardim Botânico De Brasília: 18
Fluxos (No, N2o, Ch4, Co2): 145
Fogo: 26; 87; 111; 131; 132; 145
Infiltração De Água: 87
Latossolo: 32; 65
Microclima: 26
Nitrato: 80
Potencial Hídrico: 54
Regime Térmico: 131
Temperatura: 111; 132
Vegetação: 44
Spinturnicidae: 61
Stigonemataceae: 168
Sucesso Reprodutivo: 171
Symphyta: 175; 176
Tangará Chifrudo: 97; 98
Tanoniscus Nanus: 177
Tecido Foliar: 66; 67
Temperatura
Ar: 111
Cambio: 172
Solo: 111; 131; 132
Tenthredinidae: 175
Termitidae: 22; 30; 31; 32
Territorialidade: 82
Thylamys Velutinus: 181
Tiê Do Cerrado: 3
Tinamidae: 177
Tinamiformes: 177
Trigona Spinipes: 70
Tyrannidae: 99
Uso De Árvores Gomíferas: 38
Vegetação : 44; 47; 48; 56; 149
Gradiente De: 78; 143
Vellozia Squamata: 136
Velloziaceae: 136
Vespas Sociais, Ninhos: 73
Vespidae: 73
Vochysia : 134
Vochysia Thyrsoidea: 68
Vochysiaceae: 68; 134
Xiphydriidae: 176
Zingiberaceae: 12